

Reconnaitre et lutter contre les indésirables

Les altises

- Elles mesurent environ 2 mm et font des trous en dentelle
- Elles s'attaquent aux légumes-feuilles et aux crucifères

Contre les altises

- Les arroser régulièrement, même en plein soleil, jusqu'à disparition
- Utiliser des pièges collants jaunes recouverts de gelée de pétrole ou de colle *Tangle Trap*

En prévention (ou lorsqu'elles sont peu nombreuses)

- Recouvrir d'une toile flottante (agrotexile blanc)
- Pulvériser une préparation d'ail/piments

Les limaces

Elles dévorent les légumes-feuilles (trous irréguliers).

Contre les limaces

- Les ramasser à la main (facile et efficace!)
- Faire un lit de coquilles d'œuf autour du plant à protéger (à changer souvent)
- Les noyer dans un pot rempli de bière affleurant à la surface du sol
- Les piéger en déposant des planches de bois dans les allées du jardin. Retourner les planches en plein soleil avant de les écraser



En prévention

- Utiliser des répulsifs tels que le marc de café, le thym, l'extrait de pépins de pamplemousse

La piéride du chou

Les chenilles (de couleur verte) dévorent les feuilles des crucifères en laissant un purin vert.

Contre la piéride du chou

- Ramasser à la main les chenilles
- Pulvériser de l'eau salée sur les feuilles (1c. à soupe/litre d'eau)
- Appliquer du BT (*Bacillus Thuringensis*) et le renouveler régulièrement, spécialement après la pluie



La chrysomèle rayée du concombre (courges)

Les larves dévorent les racines. Les adultes (rayés jaune et noir) commencent à grignoter les feuilles à la fin du printemps avant de s'accoupler dans les fleurs et d'en manger le fond.

Contre la chrysomèle rayée du concombre

- Ramasser à la main tôt le matin les couples dans les fleurs
- Installer des pièges collants jaunes recouverts de gelée de pétrole ou de colle *Tangle Trap*

En prévention (ou lorsqu'elles sont peu nombreuses)

- Essayer l'aspersion des plants avec une bouillie d'ail et de piment forts
- Recouvrir d'une toile flottante (agrotexile blanc)

La larve de la mouche de la carotte et de l'oignon

Ce sont de très petites mouches, perceptibles surtout par les dégâts de leurs larves.

En prévention

- Utiliser une toile flottante (agrotexile blanc) ou bien butter
- Pulvériser des répulsifs naturels (décoction ail/piment)
- Répandre du marc de café et le remplacer régulièrement selon la météo

Les doryphores

Ils aiment particulièrement les patates, et parfois les aubergines.

Contre les doryphores

- Ramasser les adultes régulièrement et les détruire
- Écraser les œufs et les larves (attention, les œufs ressemblent à ceux de la coccinelle)
- Appliquer du BT (Bacillus Thuringensis) et le renouveler régulièrement, spécialement après la pluie



Les noctuelles (vers gris)

La chenille de la noctuelle prend l'apparence d'un gros vers gris qui peuvent atteindre jusqu'à 5 cm de long. On peut soupçonner sa présence lorsque les jeunes légumes de moins de 2-3 semaines sont coupés nets au-dessus du sol et que leurs têtes restent sur place sans être mangées.

Contre les noctuelles

Enfoncer une barrière physique (2 po/5 cm de profondeur) autour du jeune plant (boîte de conserve coupée ou rouleau de papier de toilette coupé).

Les pucerons

Les plantes attaquées par les pucerons se reconnaissent par la substance mielleuse qu'ils sécrètent.

Contre les pucerons

- Utiliser un bon jet d'eau sous pression puis pulvériser une solution d'alcool à friction (200 ml d'alcool à 70% avec un jet de savon à vaisselle et compléter à 1 litre avec de l'eau). Appliquer pendant 12 à 16 jours, tous les 4 jours.
- S'il s'agit d'une plante de petite taille, écraser les pucerons à la main ou tailler la plante afin d'éliminer la colonie.



Les « gros » ravageurs

Pour **les écureuils**, vous pouvez les effaroucher (en variant les « effaroucheurs » chaque semaine) avec, par exemple, des assiettes en aluminium qui bougent et qui font du bruit ou d'autres accessoires qui font office d'épouvantail (idéalement mouvant et sonore). La présence de chats peut aussi être un facteur de prévention des dégâts. Il faut attirer **les marmottes, les rats musqués et les mouffettes** (jardin en terre) dans une cage avec des pommes et du beurre d'arachide. Vérifiez si votre municipalité ou votre bureau d'arrondissement prête des cages avant d'en louer une!

